

# Czy słyszysz to, co ja słyszę?



*Maluchy używają swoich zmysłów—zwłaszcza słuchu—do odkrywania świata. Chwilowa lub stała utrata słuchu u dziecka, może być spowodowana częstymi infekcjami ucha, urazami lub chorobą. Utrata słuchu może powodować zwolniony rozwój mowy i inne problemy związane z uczeniem się. Prawo stanu Illinois wymaga, aby wszystkie położnicze szpitale badały słuch u noworodków. Badanie słuchu u dzieci jest też obowiązuje w żłobkach i w przedszkolach. Rodzice i nauczyciele pełnią ważną rolę w obserwowaniu dzieci pod kątem zaburzeń w rozwoju słuchu.*

## Jak wygląda normalny rozwój słuchu?

- Każde trzymiesięczne niemowlę powinno reagować na głos swoich rodziców. W wieku sześciu miesięcy, dziecko powinno obracać głowę w kierunku dźwięku.
- Normalnie rozwijające się dziecko zaczyna naśladować dźwięki lub niektóre słowa, w wieku dwunastu miesięcy. Maluch będzie także próbował powiedzieć słowa, jak „mama” lub „bye”.
- Dwuletnie dziecko rozumie słowa komunikujące czynności, takie jak: „biegnij”, potrafi także wykonywać proste instrukcje słowne.

Porozmawiaj z rodzinnym pediatrą, o innych metodach sprawdzania słuchu u dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z American Speech—Language—Hearing Association, pod numerem 1-800-638-8255.

## Jakie są najczęściej spotykane objawy utraty słuchu?

- Dziecko z utratą słuchu może wydawać się nieuważne albo oporne.
- Maluch ten nie będzie rozumiał wszystkich słów, lub będzie słyszał tylko niektóre dźwięki.
- Będzie oglądał telewizor albo słuchał radia głośniej.
- Dziecko takie może robić wrażenie, że nie zapamiętuje dobrze lub mówi niewyraźnie.

## Co powinnaś zrobić, jeżeli podejrzewasz że twoje dziecko ma problemy ze słuchem?

Spytaj się lekarza rodzinnego, czy twoje dziecko powinno mieć zbadany słuch przez specjalistę.

## Jak ważne jest leczenie?

Wczesne rozpoznanie, jak i leczenie wad słuchu jest bardzo ważne. Naukowe badania wykazały, iż dzieci urodzone z wadą słuchu, zaczynają szkołę w normalnym czasie, jeżeli odpowiednia opieka nad dzieckiem rozpocznie się przed szóstym miesiącem życia. Leczenie polega na znalezieniu zasadniczych powodów utraty słuchu, dokonaniu zmian w otoczeniu, wprowadzeniu odpowiednich ćwiczeń, używaniu narządów słuchu lub operacji. Wczesne rozpoznanie utraty słuchu i podjęcie natychmiastowego leczenia zapobiega problemom związanym z uczeniem się i społecznym rozwojem dziecka.

*Opinie i wskazówki zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje tutaj podane nie mogą być traktowane jako porady medyczne i nie zastępują diagnozy lekarskiej ani właściwego leczenia medycznego. Radzimy rodzicom, aby z pytaniami na temat stanu zdrowia ich dzieci zwracali się do lekarzy lub innych wykwalifikowanych przedstawicieli służby zdrowia.*

**English Title: Do You Hear What I Hear?**



29 Children's Research Center  
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469  
Telefon: 217-333-1386 • Fax: 217-244-7732  
Za darmo: 877-275-3227 (Voice/TTY)  
Email: iel@uiuc.edu  
Internet: <http://illinoisearlylearning.org>

Illinois State Board of Education

Więcej stron z poradami możesz znaleźć pod adresem <http://illinoisearlylearning.org>