

# 您能听到我所听到的吗？



小孩子会用他们所有的感官，特别是听觉，去探索他们的世界。暂时性或永久性听力损失可能是天生的，也可能在频繁的耳部感染、损伤或疾病之后出现。听力损失会减缓语言发展，并导致其他学习问题。在伊利诺伊州，法律要求所有医院对新生儿进行听力测试。所有幼儿园和有执照的托儿中心均须每年对**3岁或3岁以上**的儿童进行听力筛查。在确定哪些孩子需要进一步筛查时，家长和教师也发挥着重要作用。

## 正常听力发育的标志是什么？

- **3个月大时**，婴儿对父母声音的反应会变得更加警觉。**6个月大**的婴儿转向声音发出的方向，并发出一系列的咿呀声音。
- **12个月大**的时候，婴儿开始模仿声音，可能会说一些单词，比如“妈妈”或“拜拜”。
- 大约**2岁左右**，幼儿能够理解动作词，比如跑步；遵循简单的口头指示；使用两到三个单词的句子。

请向您的医疗服务机构索取听力检查表，或致电 **(800) 638-8255** 联系美国语言听力协会 (**American Speech-Language-Hearing Association**) 获取免费信息。

## 听力损失的常见标志有哪些？

- 患有听力损失的孩子可能看起来注意力不集中或有抵制倾向。
- 他可能会误解单词，或者只能听到一部分声音。
- 她可能对电视或收音机不感兴趣。
- 他可能讲不清楚，或说出的话让人难以理解。

## 如果我怀疑孩子患有听力损失，我应该怎么做？

询问您孩子的医疗服务机构，是否需要由训练有素的专业人员进行筛查，或者询问当地学区的听力顾问。

## 治疗有多重要？

早期治疗可以改变一生。研究表明，如果在**6个月大**的时候得到适当治疗，先天性耳聋的孩子通常可以在适当学龄时拥有正常的语言和学习技能。治疗方法包括寻找潜在原因；改变环境；提供训练、练习、采用助听器或手术。尽早治疗听力损失可避免与听力相关的学习和社会问题。

### English Title: Do You Hear What I Hear?



13 Children's Research Center  
University of Illinois at Urbana-Champaign  
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469  
Telephone: 217-333-1386  
Toll-free: 877-275-3227  
E-mail: iel@illinois.edu  
<https://illinoisearlylearning.org>



Illinois  
State Board of  
Education