

Czy słyszysz to, co ja słyszę?



Maluchy używają do odkrywania świata wszystkich swoich zmysłów – zwłaszcza słuchu. Chwilowa lub stała utrata słuchu u dziecka może występować od urodzenia lub być spowodowana częstymi infekcjami ucha, urazami lub chorobą. Utrata słuchu może powodować zwolniony rozwój mowy i inne problemy związane z uczeniem się. Prawo stanu Illinois wymaga, aby wszystkie szpitale położnicze przeprowadzały badania słuchu u noworodków. Coroczne badanie słuchu u wszystkich dzieci w wieku 3 lat i więcej jest również obowiązkowe we wszystkich licencjonowanych żłobkach i przedszkolach. Rodzice i nauczyciele pełnią ważną rolę w obserwowaniu dzieci pod kątem zaburzeń w rozwoju słuchu.

Jak wygląda normalny rozwój słuchu?

- Każde trzymiesięczne niemowlę powinno reagować na głos swoich rodziców. W wieku sześciu miesięcy dziecko powinno obracać głowę w kierunku dźwięku oraz gaworzyć.
- Normalnie rozwijające się dziecko zaczyna naśladować dźwięki lub niektóre słowa do dwunastego miesiąca życia. Maluch będzie próbował powiedzieć słowa takie, jak „mama” lub „pa-pa”.
- Dwuletnie dziecko rozumie słowa komunikujące czynności, takie jak: „biegnij”, wykonuje również proste instrukcje słowne, a także posługuje się zdaniami składającymi się z dwóch-trzech wyrazów.

Porozmawiaj z rodzinnym pediatrą o innych metodach sprawdzania słuchu u dzieci. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z American Speech-Language-Hearing Association pod numerem (800) 638-8255.

Jakie są najczęściej spotykane objawy utraty słuchu?

- Dziecko z utratą słuchu może wydawać się nieuważne albo oporne
- Nie będzie rozumiało wszystkich słów lub będzie słyszało tylko niektóre dźwięki
- Może nie być zainteresowane oglądaniem telewizji lub słuchaniem radia
- Może mówić niewyraźnie lub niezrozumiale

Co należy zrobić, jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma problemy ze słuchem?

Spytaj lekarza rodzinnego, czy Twoje dziecko powinno mieć zbadany słuch przez specjalistę, lub poproś o rozmowę z konsultantem ds. słuchu w Twoim okręgu szkolnym.

Jak ważne jest leczenie?

Wczesne rozpoznanie jak i leczenie wad słuchu jest bardzo ważne. Naukowe badania wykazały, iż dzieci urodzone z wadą słuchu zaczynają naukę w szkole posiadając normalne umiejętności językowe i w zakresie uczenia się, jeżeli odpowiednia terapia rozpocznie się przed szóstym miesiącem życia. Leczenie polega na znalezieniu zasadniczych powodów utraty słuchu, dokonaniu zmian w otoczeniu, wprowadzeniu odpowiednich ćwiczeń, używaniu aparatów słuchowych lub operacji. Wczesne rozpoznanie utraty słuchu i podjęcie natychmiastowego leczenia zapobiega problemom związanym z uczeniem się i społecznym rozwojem dziecka.

Opinie i wskazówki zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje tutaj podane nie mogą być traktowane jako porady medyczne i nie zastępują diagnozy lekarskiej ani właściwego leczenia medycznego. Radzimy rodzicom, aby z pytaniami na temat stanu zdrowia ich dzieci zwracali się do lekarzy lub innych wykwalifikowanych przedstawicieli służby zdrowia.

English Title: Do You Hear What I Hear?



13 Children's Research Center
University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469
Telephone: 217-333-1386
Toll-free: 877-275-3227
E-mail: iel@illinois.edu
<http://illinoisearlylearning.org>

